

PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA HPV IMUNIZACIJOM



ZA VIŠE INFORMACIJA
POSETITE
WWW.HPVINFO.RS



ŠTA JE HPV?

HPV je skraćenica za "humani papiloma virus" i predstavlja skupinu od preko 200 virusa. HPV infekcija je veoma česta. HPV se najčešće dobija pri seksualnom kontaktu sa inficiranom osobom. Većina HPV infekcija ne iziskuje lečenje. Međutim, kod nekih ljudi, HPV infekcija se može zadržati i izazvati različite oblike raka, kao i genitalne bradavice.

80%

ljudi će u nekom trenutku u životu biti inficirani HPV-om

KOJE TIPOVE RAKA HPV MOŽE PROUZROKOVATI?

Većina HPV infekcija (9 od 10) prođe spontano u periodu od oko dve godine. Međutim, HPV infekcija može perzistirati i uzrokovati ozbiljne zdravstvene teškoće:

- karcinom grlića materice, vulve i vagine kod žena
- karcinom penisa kod muškaraca
- karcinom usne duplje, ždrela i anusa kod oba pola
- genitalne kondilome kod oba pola

Tokom 2020. godine u Srbiji je*

1.087

žena obolelo
od raka grlića
materice

453

žena preminulo
od posledica
ove bolesti

*Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije
„Dr Milan Jovanovic Batut“

DA LI JE VAKCINA PROTIV HPV-A BEZBEDNA?

Od 2006. godine, kada je započeta primena HPV vakcine, kod više od 1 milion učesnika u preko 100 studija koje su pratile bezbednost HPV vakcine nije zabeležen nijedan slučaj ozbiljnih neželjenih reakcija koje se mogu dovesti u vezu sa primenom HPV vakcine.

Više od
500
miliona doza
HPV vakcine

dato je u
preko
140
zemalja

Poznata je pojava blagih do umerenih reakcija nakon primene vakcine protiv HPV-a. Najčešće nuspojave su glavobolja, bol u mišićima, reakcije na mestu davanja vakcine kao što su bol, crvenilo, oticanje i iscrpljenost i umor. Te reakcije ne traju dugo i najčešće prolaze same od sebe.

**SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (SZO)
HPV VAKCINE SMATRA EKSTREMNO BEZBEDNIM!**

U KOJIM ZEMLJAMA SE PRIMENJUJE HPV VAKCINA?

Preko 140 zemalja sveta imaju program HPV vakcinacije, a u 47 zemalja programi obuhvataju i dečake i devojčice. Među ovim zemljama su: Australija, Italija, Novi Zeland, Norveška, Velika Britanija, SAD...

KOME I KADA SE U SRBIJI PREPORUČUJE VAKCINA PROTIV HPV?

Devetovalentna HPV vakcina je prema Pravilniku o Programu imunizacije Republike Srbije besplatna i preporučena za dečake i devojčice između 9 i 19 godina. Devojčice i dečaci u uzrastu do 14 godina primaju 2 doze vakcine u razmaku od 6 meseci. Nakon 15. rođendana vakcina se prima u 3 doze. Preporučuje se razmak od 2 meseca između prve i druge doze, tj. 4 meseca između druge i treće doze. Preporučuje se da se sve 3 doze prime u roku od 12 meseci.

Vakcina protiv HPV-a se sme primenjivati istovremeno sa drugim vakcinama, kao što je kombinovana vakcina protiv difterije i tetanusa (dT) koja je obavezna za učenike sedmog razreda prilikom redovnog sistematskog pregleda. Razgovarajte sa vašim pedijatrom i zakažite vakcinaciju protiv HPV-a u vašem domu zdravlja.